

Preparación Travad Oral Toma de la preparación:

Sugerencia al iniciar la preparación tome 1 hora antes una tableta de plasil (metoclopramida) para una mejor tolerancia a la misma. Tomar el primer frasco de Travad Oral Limón x 133 ml. a las 2:00 p.m., el segundo a las 4:00 p.m. y el tercero a las 6:00 p.m. (cada frasco lo puede mezclar con un vaso de jugo de naranja ó gaseosa cuatro, lo debe tomar despacio).

» Es importante que se encuentre en un lugar cómodo (idealmente en su casa) porque va a presentar múltiples evacuaciones intestinales.

» Si toma medicamentos para la presión o para el corazón debe tomarlos como lo hace habitualmente y consultar al medico solicitante en caso de consumir aspirina o warfarina

Instrucciones para la administración de los productos Travad

- Antes de iniciar su administración lea las instrucciones de uso:


TRAVAD ORAL SABOR A LIMÓN:




1
GUARDE EN LA NEVERA
EL FRASCO DE TRAVAD
ORAL LIMÓN X 133.



2
DILUIR EN 250 mL. DE AGUA
O JUGO DE NARANJA,
EL FRASCO DE TRAVAD ORAL
LIMÓN X 133.



3
REVLVER EL CONTENIDO
DURANTE VARIOS
SEGUNDOS.



4
TOMAR ENSEGUIDA TODO
EL CONTENIDO DEL VASO.