

## **INSTRUCCIONES POST-COLOCACION BALON INTRAGASTRICO**

1. Seguir instrucción por parte de nutrición.
2. Nexium x 20 mg Tabletas  
Tomar una cada 12 horas antes del desayuno y comida durante un mes. Luego una diaria antes del desayuno permanentemente. Los primeros días disolver la tableta en medio pocillo de agua.
3. Voltaren x 75 mg Ampollas No. 2  
Aplicar una ampolla diaria por dos días, por vía intramuscular (hoy y mañana ).
4. Buscapina compuesta Ampollas No. 2  
Aplicar una cada día por vía intramuscular ( si es necesario aplicar una cada 12 horas al día para el dolor)
5. Ondex (Ondasetrón ) o una de las otras marcas comerciales existentes en el mercado, de 4 mg o de 8 mg tabletas caja no. 1 ( se consigue más facilmente en la droguería de la Clínica del Country o de Marly.)  
Tomar una cada 8 horas para las nauseas y el vómito.
6. Hoy y mañana chupar hielo, tomar Clight, Hidraplus,Rehidralite caldos, aromática.  
Luego iniciar progresivamente sopas, licuado de pollo y seguir estrictamente las instrucciones por parte de nutrición.
7. Recuerde: el primer día hay dolor abdominal importante, nauseas, eructos y eventualmente vómito.
8. En caso de orinar azul o verde llamar inmediatamente al: